

SUPERTECH

25



SAMESTELLING

Nutriënt	g/kg
Ru-proteïen (min.)	250
Ruproteïen vanaf NPN (maks.)	35%
Ureum (maks.)	28.2
Vog (maks.)	120
Ru-vet (min.)	14
Ruvesel (maks.)	80
Kalsium (min.)	6.5
Kalsium (maks.)	13
Fosfor (min.)	6.5
Ca:P Verhouding	1-2:1
Magnesium (min.)	2.5
Sulfaat (min.)	4
Kalium (min.)	11
Yster (min.)	57 mg/kg
Koper (min.)	16 mg/kg
Mangaan (min.)	60 mg/kg
Sink (min.)	60 mg/kg
Kobalt (min.)	0.33 mg/kg
Jodium (min.)	0.23 mg/kg
Selenium (min.)	0.33 mg/kg
ME Sheep	7.5 MJ/kg

VOER AANBEVELINGS

- Die produk is 'n supplement en nie 'n voer nie.
- Voldoende weiding/ruvoer moet deurgaans beskikbaar wees.
- Hou lekbakke vol om gulsige vreet deur honger diere te voorkom.
- 'n Gereelde daaglikse inname kan vergiftiging help voorkom.
- 'n Soutfosfaatlek moet ten minste 7 dae voor die verskaffing van 'n NPN-bevattende lek voorsien word om southonger en oormatige inname van ureum te voorkom.
- Stoor in 'n koel, droë plek, weg van direkte sonlig.

Vorm: Meel of Pille

Verpakking: Losmaat of 40 kg Sakke

WAARSKUWING

Hierdie veevoer bevat 'n NPN bron en geregistreerde medikamente. Voer streng volgens voorskrifte. Vir medikament besonderhede sien die bykomende sak etikette.

12 Byls Bridge Boulevard
Highveld Ext 73
Centurion

Tel: +27 11 063 2347
afgrianimalfeeds.co.za

Klaar gemengde hoë kwaliteit produksielek vir skape en bokke

- Geskik vir produserende skape en bokke op lae kwaliteit weidings of ruvoer.
- Voorsien optimale kwantiteit en kwaliteit natuurlike proteïen, NPN, minerale, spoorminerale en energie vir ekonomiese benutting van lae kwaliteit ruvoer.
- Voorsien hoë vlakke van rumen verbyvloei proteïen en energie vir beter GDT asook melk- en wolproduksie.
Word aanbeveel vir prikkelvoeding, dragtige- en lakterende ooie en uitgroei van jong kleinvee.

GEBRUIKSAANWYSINGS

1. Beskerm hierdie veevoer teen reën. NPN (Bv. Ureum) is oplosbaar en diere wat so 'n oplossing drink kan vergiftig word.
2. Moet nie hierdie veevoer onoordeelkundig saam met ander NPN-bevattende veevoere voer nie. Raadpleeg 'n AFGRI Veevoere Tegniese Adviseur vir die nodige aanbevelings.
3. Asyn is 'n doeltreffende middel teen NPN-vergiftiging. Behandeling: Meng met gelyke hoeveelhede water en doseer 'n halwe bottel per half of groot skaap en 2 tot 4 bottels per bees (1 bottel = 750ml).
4. Riglyne vir inname: Inname sal bepaal word deur die produksie status van diere en die kwaliteit en kwantiteit van die weiding.
5. Lek inname moet bestuur word. Dit word aanbeveel om die verlangde hoeveelheid daaglik aan diere te voorsien. Navorsing toon egter dat indien diere die verlangde daaglikse hoeveelheid lek in 'n korter tyd vreet, daar nie probleme onder vind word nie. Indien bestuur slegs toelaat om bv. elke derde dag lek uit te plaas, verskaf dan die verlangde hoeveelheid lek as volg (g/dier x aantal diere x 2 dae). Hierdie voermetodes maak dit moontlik om onder alle omstandighede die verlangde innames te verkry, wat nie moontlik sou wees indien sout uitsluitlik as innamereguleerder gebruik word nie. Voldoende kripspasie is van uiterste belang.

AANBEVOLE INNAME

Dier	g/dier/dag
Lakterende ooie	300 - 500
Jong groeiende diere	250 - 500

Klas: MINERAAL, PROTEÏEN, ENERGIE EN SPOORMINERAAL
SUPPLEMENT VIR SKAPE
Reg. nr.: V17086 – Wet 36/1947
AFGRI Produktkode: R1193


AFGRI

ANIMAL FEEDS